

本田期の防除

■本田期の病害虫基本防除■

薬 剤 名	ブーンレパード箱粒剤			稲大將箱粒剤		
おもな 対象病害虫名	・いもち病 ・イネミズゾウムシ ・イネドロオイムシ			・いもち病 ・イネミズゾウムシ ・イネドロオイムシ ・イナゴ類		
栽 培 方 法	慣行苗栽培	高密度播種苗栽培		慣行苗栽培	高密度播種苗栽培	
防 除 時 期	播種時(覆土前)～ 移植当日	播種時(覆土前)～ 移植当日	移植時	播種時(覆土前)～ 移植当日	播種時(覆土前)～ 移植当日	移植時
散 布 量	1 箱当たり50g	10a当たり1kg (1箱当たり約50～100g)	10a当たり1kg	1 箱当たり50g	10a当たり1kg (1箱当たり約50～100g)	10a当たり1kg
総使用回数	1 回			1 回		
使用上の注意	・均一に散布する ・ハウス内での跡作を予定している場合は、ハウス内での散布はしない ・葉に付着した薬剤は払い落とし、散布後必ず軽く散水する ・かぶれることがあるので、ビニール手袋等で防護する		・側条施薬機を使用する	・均一に散布する ・ハウス内での跡作を予定している場合は、ハウス内での散布はしない ・葉に付着した薬剤は払い落とし、散布後必ず軽く散水する ・かぶれることがあるので、ビニール手袋等で防護する		・側条施薬機を使用する
薬剤パッケージ						

○出穂前後の防除体系

月 旬	6 月中旬	7 月下旬	8 月上旬	8 月中旬
早 生		穂 揃 期 1 回目	傾 穂 期 2 回目	傾 穂 後 期 随時防除 (キラップ粉剤DL)
中 生		随時防除 早生：7月上旬 中生：7月中～下旬 晩生：7月下旬 ★紋枯病★ バリダシン粉剤DL バリダシン液剤 バリダシンエアー ★稲こうじ病★ Zボルドー粉剤DL トライフロアブル	出 穂 期 1 回目	傾 穂 期 2 回目
直 播	梅 雨 時 期 オリブライト250 G		出穂直前 1 回目	穂 揃 期 2 回目
晩 生			出穂直前 1 回目	穂 揃 期 2 回目

※防除前にイネ科雑草の穂が出ない様に草刈りの徹底に努める

○湛水・乾田直播栽培の病害虫基本防除

	薬剤名	オリブライト250G	
1 回	対象病害虫	いもち病・紋枯病	
	10a当たり散布量	250g	
	防除時期	必ず6月20日までに	
	使用上の注意	・湛水状態(3～5cm)で均一に散布する ・散布後7日間は止め水とし湛水状態を保つ ※FS剤施用時は使用しない	

○本田の液剤防除（無人航空機・ハイクリブーム・動力噴霧機）

	作業機名	無人航空機	ハイクリブーム・動力噴霧機
1 回目	薬剤名	ビームエイトスタークルゾル (8倍)	ビームエイトスタークルゾル (1,000倍)
	原液量	0.1 ㍓	0.15 ㍓
	10a当たり散布量	0.8 ㍓	150 ㍓
	総使用回数	3 回以内（収穫7日前まで）	3 回以内（収穫7日前まで）
2 回目	対象病害虫名	いもち病・カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ	いもち病・カメムシ類・ウンカ類・ツマグロヨコバイ
	殺虫剤名	キラップフロアブル (8倍)	キラップフロアブル (1,000倍)
	原液量	0.1 ㍓	0.15 ㍓
	10a当たり散布量	0.8 ㍓	150 ㍓
	総使用回数	2 回以内（収穫14日前まで）	2 回以内（収穫14日前まで）
	対象害虫名	カメムシ類・ウンカ類	カメムシ類・ウンカ類

※3回目防除についてはP56を参照する

○本田の粉剤防除

		粉剤防除	薬剤パッケージ
1 回目	薬剤名	ビームスタークル粉剤5DL	
	防除時期	早生 7月下旬 中生・直播・晩生 8月上旬	
	10a当たり散布量	4kg	
	総使用回数	3 回以内(収穫7日前まで)	
2 回目	対象病害虫名	いもち病・イナゴ類・カメムシ類・ウンカ類	
	殺虫剤名	キラップ粉剤DL	
	防除時期	早生 8月上旬 中生・直播・晩生 8月中旬	
	10a当たり散布量	4kg	
	総使用回数	2 回以内(収穫14日前まで)	
	対象病害虫名	カメムシ類・ウンカ類	

※3回目防除についてはP56を参照する

○止葉からの出穂期予想

