

直播栽培における本田雑草防除

- ・散布後7日間は、落水しない
- ・体系は正剤使用の場合は散布後5日間は湛水状態（水深5cm）を保つ
- ・散布後に多量の降雨が予想される場合や畦畔からの漏水が大きいほ場では使用を避ける

◆農薬のラベルをよく読み、記載された安全使用基準を守って使用すること

形状	農 薬 名	散布方法	無人航空機 による散布	適 用 雑 草											WCSの 登録		使 用 時 期	10aあたり使用量 (総使用回数) (希釈水量)	散布時の 水の状態	使 用 上 の 注 意
				ヒエ	広葉雑草									藻類						
				ノビエ	ホタルイ	クログワイ	イボクサ	オモダカ	コナギ	ウリカワ	クサネム	セリ	ミズガヤ							
体系は正剤	粒 剤	ベルーガ1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	－	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	有		播種時 播種直後～ノビエ3.0葉期まで (但し収穫75日前まで)	1kg (1回)	水深5cm (湛水)	・使用後2～3日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない
		ブライオリティ1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	有		播種時 播種直後～ノビエ3.5葉期まで (但し、収穫90日前まで)	1kg (1回)		・使用後2～3日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない
		デオーレ1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	有		イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (但し、収穫90日前まで)	1kg (1回)		・散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、7日間は落水、かけ流しはしない ・稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさける
		サラブレッドGO1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	○	－	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	有	イネ1.0葉期～ノビエ2.5葉期まで (但し、収穫90日前まで)	1kg (1回)		・水田に十分水を張って使用する(極端に土のもどりが悪い水田では使用を避ける) ・使用後2～3日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない ・稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさける
	省力タイプ	デオーレ顆粒	水口処理	－	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	有		イネ1.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (但し、収穫90日前まで)	80g (1回)	水深5～6cm (湛水)	・薬剤処理後、必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意する ・成分の拡散に2～3日を要するので、水持ちの良い圃場で使用する ・稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさける
		サラブレッドGOジャンボ	投込み	－	◎	◎	○	－	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	有	イネ1.0葉期～ノビエ2.5葉期まで (但し、収穫90日前まで)	400g 40g×10個 (1回)	水深6cm以上 (湛水)	・使用時には濡れた手で散布しない ・使用後、7日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない ・使用後、できる限りの止水管理を行う
		ブライオリティジャンボ	投込み	－	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	－	有	イネ出芽前期～ノビエ3.5葉期まで (但し、収穫90日前まで)	250g 25g×10 (1回)	水深5～7cm (湛水)	・散布の際は、やや深めの湛水状態(水深5～7cm)にして水の出入りを止める ・散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm)を保ち、散布後7日間は落水かけ流しはしない ・藻類・表層剥離・浮草等の浮遊物が多い場合拡散が不十分になる恐れがあるため、使用は避ける
		ブライオリティ豆つぶ250	投込み ひしゃく	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	－	有	イネ出芽前期～ノビエ3.5葉期まで (但し、収穫90日前まで)	250g (1回)	水深8cm (湛水)	・散布後5日間は湛水状態(水深5cm)を保つ ・使用後2～3日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない
中後期剤	粒 剤	ブイゴールSM1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	○	－	○	◎	○	◎	○	◎	○	有	イネ5.0葉期～ノビエ3.0葉期まで (但し、収穫60日前まで)	1kg (1回)	水深5cm (湛水)	・散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない ・散布後異常高温が予想される場合は使用しない
		トドメMF1キロ粒剤	動力散布	○	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	有	イネ3.5葉期～ノビエ4.0葉期まで (但し、収穫50日前まで)	1kg※2 (3回以内)		・散布後3日間は湛水状態(水深5cm)を保つ
		アクシズMX1キロ粒剤	動力散布	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	－	有	イネ1.0葉期～ノビエ4.0葉期まで (但し、収穫45日前まで)	1kg (1回)		・散布後7日間は湛水状態(水深3～5cm)を保つ ・水田に十分水を張って使用する(極端に土のもどりが悪い水田では使用を避ける) ・散布後に異常低温が予測される場合は、薬害を生じるおそれがあるので注意する
		バサグラン粒剤	動力散布	○	－	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	－	有	イネ3.0葉期～収穫45日前まで	3kg※1 (1回)	落水	・落水後、水戸尻をしっかりとめて速やかに散布する(スポット処理可能) ・散布後3日間は落水状態を保つ ・翌日に降雨が予想される場合は散布を控える
		バイスコープ1キロ粒剤	動力散布	○	－	◎	－	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	－	－	イネ3.0葉期～出芽後50日 (但し、収穫45日前まで)	1kg (1回)	水深5cm (湛水)	・水の出入りを止めてごく浅い湛水または通常の湛水状態のまま田面に均一に散布する ・散布後7日間は落水、かけ流しはしない
		モグテン粒剤	動力噴霧	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	◎	有	イネ1.0葉期以降、アオシロ、表層はく離発生時(但し、収穫45日前まで)	1.5～2kg (3回以内)	水深3cm (湛水)	・湛水状態で散布し、散布後は少なくとも3～4日間は湛水状態を保つ ・水稻が水没するような深水で使用する と薬害を生じることがあるので通常の湛水状態を保ち、必ずイネの葉先が水面上に出ている状態で使用する ・藻にかかるように散布する(スポット処理可能)
	液 剤	クリンチャーEW	動力噴霧	○	◎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	有		播種後10日～ノビエ5.0葉期まで (但し、収穫30日前まで)	100ml (2回以内) (25～100ℓ)	湛水 または落水	・落水散布の場合、水戸尻をしっかりとめて速やかに散布する(スポット処理可能) ・湛水散布の場合、散布時は浅水とし散布後3日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない ・イネに対して薬害が少ない ・使用時には展着剤を加用する
			無人航空機														播種後10日～ノビエ4.5葉期まで (但し、収穫30日前まで)	100ml (2回以内) (0.8～1.6ℓ)		
		トドメバスMF液剤	動力噴霧	－	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	－	有	播種後10日～ノビエ6.0葉期まで (但し、収穫50日前まで)	1,000ml※1※2 (2回以内) (70～100ℓ)	乾田・落水状態で 雑草茎葉散布 または全面散布	・落水後、水戸尻をしっかりとめて速やかに散布する(スポット処理可能) ・散布後3日間は落水状態を保つ ・展着剤の加用を必要としないが、雑草に付着するように散布する
		ロイヤント乳剤	動力噴霧	－	◎	－	－	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	－	有	イネ3.0葉期～ノビエ5.0葉期 (但し、収穫45日前まで)	200ml※3 (2回以内) (100ℓ)	落水	・乾田または落水状態で散布する際は早め(3日以内)に入水する ・幼穂形成期以降の散布では薬害のおそれがあるので注意する ・散布機、ホース、ノズル、タンク等の器具は、使用後速やかに十分に洗浄する
		アレイルSC	動力噴霧	－	◎	◎	○	－	○	◎	◎	◎	◎	◎	－	有	イネ3.0葉期～ノビエ5.0葉期 (但し、収穫45日前まで) ※出穂始期15日前まで	500ml※4 (1回) (100ℓ)	湛水 または落水	・薬害のおそれがあるので、出穂始期の15日前までに散布する。また、重複散布はさける ・少量散布(25～50ℓ/10a)の場合は、専用ノズルを使用する ・使用後の散布器具は十分に洗浄する ・使用した器具を、特にアブラナ科作物、なす、ほうれんそうで使用しない
		バサグラン液剤	動力噴霧	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	－	有	播種後35日～ 収穫45日前まで	500～700ml (2回以内)※1 (70～100ℓ)	落水	・落水後、水戸尻をしっかりとめて速やかに散布する(スポット処理可能) ・散布後3日間は落水状態を保つ ・翌日に降雨が予想される場合は散布を控える
	省力タイプ	テッケンジャンボ	投込み	－	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	有	イネ4.0葉期～ノビエ4.0葉期まで (但し、収穫60日前まで)	500g (50g×10個) (1回)	水深8cm (湛水)	・使用時に濡れた手で散布しない ・散布後3～4日間は湛水状態を保つ ・散布後7日間は落水、かけ流しをしない
		ツイゲキ豆つぶ250	投込み ひしゃく	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	有	イネ5.0葉期～ノビエ4.0葉期まで (但し、収穫60日前まで)	250g (1回)	水深8cm (湛水)	・散布後5日間は湛水状態(水深5cm)を保つ ・使用後2～3日間は急激な水の動きを避けるため水戸尻をしっかりとめ激しい入水をしない

※1 バサグラン(ベンタゾン成分を含む剤)は2回以内
※2 トドメ(メタミホップ成分を含む剤)は3回以内
※3 ロイヤント(フロルピラウキシフェンベンジル成分を含む剤)は3回以内
※4 アルテア(メタゾスルフロン成分を含む剤)は2回以内
※5 クリンチャー(シハロホップブチル成分を含む剤)は3回以内