

コシヒカリ・五百万石において倒伏し易いほ場では
基肥を基準より1割程度減肥する

水稲肥料

基 肥					(単位：kg/10 a)								
品 種	栽培方法	施肥方法		前 作	基 肥			成分別重量					
		区 分 ※1	体 系 ※2		肥 料 名	施肥量	早 期 追肥量 ※3	N	P	K			
てんたか81	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコート早生専用	38		9.1	2.3	6.8			
				転 作	Jコート早生専用	30		7.2	1.8	5.4			
			分施	水 稲	基 肥555	33		5.0	5.0	5.0			
	移 植 (高密度播種苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコート早生専用	35		8.4	2.1	6.3			
				転 作	Jコート早生専用	28		6.7	1.7	5.0			
とみちから	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	LPsとみちから専用	48		11.0	6.2	6.7			
			分 施	水 稲	基 肥555	35		5.3	5.3	5.3			
五百万石	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	LPs五百万石専用	35		7.7	4.2	4.9			
				転 作	LPs五百万石専用	28		6.2	3.4	3.9			
			分 施	水 稲	基 肥555	20		3.0	3.0	3.0			
				転 作	基 肥555	12		1.8	1.8	1.8			
			てんこもり	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコートてんこもり専用	40		8.8	4.8	5.6
						分 施	水 稲	基 肥555	30		4.5	4.5	4.5
移 植 (高密度播種苗)	側条	肥効調節		水 稲	Jコートてんこもり専用	40		8.8	4.8	5.6			
直 播 (カルバー)	側条	肥効調節		水 稲	Jコートてんこもり専用	35		7.7	4.2	4.9			
直 播 (鉄コーティング)	側条	肥効調節		水 稲	鉄コート直播晩生専用	33		7.3	1.7	6.6			
コシヒカリ	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコートコシヒカリ2号	30		6.3	2.7	5.4			
				転 作	Jコート豆あとコシヒカリ	25		4.0	2.3	5.0			
			分 施	水 稲	基 肥555	15		2.3	2.3	2.3			
		全層	分 施	水 稲	基 肥555	20	7	4.1	4.1	4.1			
				転 作	基 肥555	13	7	3.0	3.0	3.0			
	移 植 (高密度播種苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコートコシヒカリ2号	27		5.7	2.4	4.9			
				転 作	Jコート豆あとコシヒカリ	23		3.7	2.1	4.6			
		側条	肥効調節	水 稲	LPss直播コシヒカリ	25		5.3	3.5	3.5			
				転 作	LPss直播コシヒカリ	20		4.2	2.8	2.8			
		側条	肥効調節	水 稲	鉄コート直播コシヒカリ専用	24		5.3	1.2	4.8			
				転 作	鉄コート直播コシヒカリ専用	19		4.2	1.0	3.8			
新大正糯	移 植 (慣行苗)	側条	肥効調節	水 稲	Jコートコシヒカリ2号	27		5.7	2.4	4.9			
				転 作	Jコート豆あとコシヒカリ	18		2.9	1.6	3.6			
			分 施	水 稲	基 肥555	15		2.3	2.3	2.3			
				転 作	基 肥555	12		1.8	1.8	1.8			

※1 側条施肥：田植と同時に苗横に基肥を施す
※2 分 施：基肥と穂肥を分けて施す
肥効調節：窒素溶出が地温によってコントロールされ、ほぼ水稲の生育時期に合わせて窒素が溶出する
※3 早期追肥：田植後7日以内に施す
●肥効調節型基肥を使用の場合でも、生育状況や天候等によって追肥が必要になる場合がある。

の基準


穂肥（分施の場合）				(単位：kg/10 a)				
品 種	穂 肥（BB穂肥35号を使用）					成分別重量		
	1 回 目			2 回 目	3 回 目	N	P	K
	幼穂長 1 mm (出穂25日前)	幼穂長10mm (出穂18日前)	幼穂長15mm (出穂15日前)	1回目散布の 1 週間後	2回目散布の 1 週間後			
てんたかく81	11			※13		3.6	0.0	4.8
とみちから	13			15	15	6.5	0.0	8.6
五百万石		13		15		4.2	0.0	5.6
てんこもり	11			※13		3.6	0.0	4.8
コシヒカリ			10	12		3.3	0.0	4.4
新大正糯			10	12		3.3	0.0	4.4

※…1回目散布の10日後

○第1回穂肥時期の目安

品 種 名	1 回目穂肥施用時		穂摘期葉色
	幼穂長 (mm)	葉 色	
てんたか81	1	4.0	4.3
とみちから	1	4.4	5.0
五百万石	10	4.0	4.6
てんこもり	1	4.0	4.5
コシヒカリ	15	3.6	4.3
新大正糯	15	3.6	4.3

※穂肥の施用は葉色・生育量・天候に応じて調整する



※幼穂の長さは2mmあるかな？
⇒幼穂の長さを確認する

肥 料 成 分 表							窒素成分の配合内容(%)							
	肥 料 名	内容量 (kg)	成分量 (%)			仮比重 ※参考	全窒素 (%)	基肥相当 速効性	つなぎ肥相当			穂肥相当		
			N	P	K				Lp50	Lps60	J70	JSD(80)	JSE(100)	Lps110
基 肥	Jコート早生専用	15	24	6	18	0.85	24.0	7.2			12.0	4.8		
	LPsとみちから専用	15	23	13	14	0.84	23.0	9.9		3.9	LP70 9.2			
	LPs五百万石専用	15	22	12	14	0.87	22.0	9.9		4.0		Lps80 8.1		
	Jコートてんこもり専用	15	22	12	14	0.84	22.0	4.4			6.6		11.0	
	Jコートコシヒカリ2号	15	21	9	18	0.86	21.0	8.4				8.8	3.8	
	LPss直播コシヒカリ	15	21	14	14	0.89	21.0	8.4						12.6
	Jコート豆あとコシヒカリ	15	16	9	20	0.91	16.0	4.8				7.8	3.4	
	鉄コート直播コシヒカリ専用	15	22	5	20	0.82	22.0	2.2	6.6					13.2
	鉄コート直播晩生専用	15	22	5	20	0.82	22.0	2.2			LP70 6.6			13.2
	基肥555※	20	15	15	15	0.94	15.0	15.0						
穂 肥	BB穂肥35号※	20	15	0	20		15.0							

※基肥555は吸湿性が高いため、作業終了ごとに田植機の施肥ホッパの清掃を徹底すること
※BB穂肥35号は溶けやすく、水口からの流し込み可能
※ほ場によって施肥量を調整し、散布すること