

田植え時の重要3ポイント

① 植付深さ3cm

② 品種に応じた植付株数

③ 基肥の適正施用

農作業コツのコツ

【第4号】
令和7年4月26日
福光農業改良協議会
砺波農林振興センター南砺班
福光農業協同組合 営農部

荒れた天気が続いており、日射があると育苗ハウス内の温度は急上昇します。ハウス内が暑くなりすぎないように**換気を徹底**しましょう。

田植えは、植付深さ3cm(苗の第一葉が田面の上に見える程度)を徹底しましょう。

田植え後は、**きめ細やかな水管理**を徹底し、初期分げつの発生を促しましょう。

また、適切な除草剤使用により、除草効果を高めましょう。

水稻・移植

※田植えの留意点はコツのコツ第3号をご確認ください(特に植付深さに注意)。


1 田植え後の水管理

- (1)田植え時～活着 (田植後3～5日程度)
- 苗が水没しない程度の**やや深水**(5cm程度)で植傷みを軽減しましょう。密苗は浮苗防止のため、**浅水**(2～3cm)としましょう。
- (2)活着後 **コツのコツ**
- 浅水管理**(2～3cm)で田水温を上げて、分げつの発生を促しましょう。
- ※ただし、強風や低温時には深水にし、天候回復後はすみやかに浅水管理にしましょう。
- (3)田んぼがわいたり、藻が発生した場合
- 晴れた日に1～2日程度、落水して**軽い田干し**を行い、水を入れ替えましょう。
- ※R6年は収穫後に発生した「ひこばえ」が大きくなったほ場が多く、秋起こしをしていないほ場では特に注意してください。

2 除草剤の使用

- ・使用基準、使用上の注意を守り、遅れずに除草剤を散布しましょう。
- ・ジャンボ剤や豆つぶ剤の散布時は水深8cm程度を確保しましょう。
- ・除草効果を高めるため、散布後5日間は**湛水状態**(水深5cm程度)を保ち、田面を露出させないよう、水が足りなくなったらゆっくりと差し水をしましょう。
- ・成分が水田外へ流出しないよう、散布後7日間はかけ流しや落水はやめましょう。

○田植え後の水管理・除草剤散布の例



※詳しくは「営農とくらし」のP36～37、60～61、64～65を参照してください。


田植作業時に気温の高い日が続きます。熱中症に気を付けて作業しましょう！

富山県農薬危害防止運動実施中(4月1日～9月30日)。農薬は適切に保管・管理し、使用後は必ず記帳しましょう。

水稻・直播


1 播種後の水管理・除草剤の使用

- (1)カルパーコーティング **コツのコツ**
- ・播種後5～7日程度は**田干し**を行い、種子に酸素を提供しましょう。
 - ・田干し後の播種後7日～10日頃(イネ1.0葉期)に湛水状態で除草剤を散布しましょう。
 - ・その後は**浅水管理**(2～3cm程度)で田水温を高め、分げつの発生を促しましょう。



(2)鉄コーティング

- ・播種同時または播種直後に必ず除草剤を散布し、播種後5～7日間は深水(水深5cm程度)による湛水管理を行い、8日目から飽水管理に切り替えましょう。
- ・イネ1.0葉期まで**飽水管理**を行い、根をしっかりと張らせ、転び苗の発生を防ぎましょう。
- ・イネ1.0葉期以降は**浅水管理**としましょう。




(3)残草に対する除草剤散布

- ・残草がある場合は、雑草の種類とイネの葉齢を確認し、除草剤を散布しましょう。除草剤については「営農とくらし」のP62～63、P65を参照してください。

大豆

1 播種前の排水対策

- ・**額縁排水溝**を早めに設置して、播種前の土壌を乾かしておきましょう。
- ・透水性の悪いほ場は、ほ場内に**基幹排水溝**を設置したり、サブソイラによる**心土破碎**を施工し、排水性の向上に努めましょう。



2 土づくり

- ・耕起前に必ず**苦土石灰**を散布し、pH6.0～6.5に酸度矯正しましょう。
- ・地力向上のため、醗酵けいふん等の有機物を積極的に施用しましょう。

表 土づくり資材の施用の目安

	10a当たりの施用量
苦土石灰	100～200kg
醗酵けいふん	100～150kg
牛ふん堆肥	2m ³ (1t)

田植機の爪などの動作部の点検は、必ずエンジンを停止させた後、手袋を着用して行いましょう。