

農作業コツのコツ

【第8号】

令和7年6月7日

福光農業改良協議会
砺波農林振興センター南砺班
福光農業協同組合 営農部

早生

中干しや間断かん水での干しすぎに注意しましょう。

早生・晩生の生育は概ね順調です。中生は、田植え以降の強風や低温の影響により、茎数の確保が遅れているほ場が散見されます。

根を増やし、根圏を拡大する時期を迎えています。生育状況を確認し、品種ごとの生育ステージに合わせた適切な水管理（**中干し・間断かん水**）を徹底しましょう。

近年は、中干し・間断かん水での干しすぎにより、穂数や1穂粒数が減少し、収量が低下したほ場が多くみられています。**干しすぎに注意**しましょう。

中生・晩生

速やかに溝を切り、中干しに入る準備をしましょう。

水稻の生育状況

（6月3日：福光農業改良協議会 良質米実証田生育調査結果）


品種名		田植日		草丈（cm）		株当たり茎数(本)		葉齢（葉）		葉色	
		R7	平年	R7	平年	R7	平年	R7	平年	R7	平年
とみちから		5/ 3	5/ 3	29.9	32.7	15.6	15.1	7.6	7.9	4.4	4.4
五百万石		5/ 5	5/ 4	23.4	26.7	17.2	12.1	8.1	8.2	4.3	4.5
てんたかく81		5/ 4	5/ 4	24.6	28.2	13.7	12.2	7.5	7.3	4.2	4.3
コシヒカリ		5/14	5/14	23.7	27.6	5.5	8.6	5.8	6.1	3.9	4.1
てんこもり		5/11	5/ 9	22.9	24.9	12.6	11.1	6.9	6.9	4.3	4.4
密苗	てんたかく81	5/ 4	5/ 4	21.6	23.1	16.9	12.3	7.1	6.9	3.9	4.2
	コシヒカリ	5/19	5/16	17.5	24.3	5.3	7.4	4.5	5.6	3.8	4.1
	てんこもり	5/ 9	5/ 8	21.9	22.4	15.7	12.1	7.0	6.3	4.2	4.4

※てんたかく81の平年値はR4～R6年の値

（調査筆数：各2筆）

水稻

1 今後の水管理




（1）早生・てんこもり

- ・ **中干しの開始時期**です。ほ場中央部で「くるぶしが沈む程度」まで干しましょう。
- ・ 茎数が少ないほ場は浅水管理を継続し、中干しはやや遅らせましょう。
- ・ 中干し後は間断かん水を行い、根に水と酸素を十分に供給しましょう。
- ・ 葉色の急激な低下を防ぐため、**乾かしすぎない**ようにしましょう。




中干し終了の目安
足跡 10 cm程度
（くるぶしが沈む程度）



昨年より落水期間を短くしています（4日→3日）

落水期間は
ほ場条件や
生育状況
を確認して調整
しましょう。



間断かん水で
徐々に田面を
固めましょう。

幼穂形成期(6/26頃)の目安
足跡3cm程度

(2) コシヒカリ

- ・溝切りを行い、中干しに入る準備をしましょう。
- ・分げつが取れていない場合は**浅水管理を徹底**し、天気の良い日に軽い田干しを行いましょう。

(3) 直播

- ・1m間の茎数が100本になったら速やかに**中干し**を開始しましょう。

2 雑草防除

ノビエ等の残草がある場合は、下表を参考に除草剤を遅れずに散布しましょう。

適用 雑草	薬剤名	使用時期		散布時の 水の状態
		移植	直播	
ノビエ のみ	トドメMF 1キロ粒剤	ノビエ5葉期まで	ノビエ4葉期まで	湛水
	クリンチャーEW（動力噴霧機） ※展着剤を加用する	ノビエ6葉期まで	ノビエ5葉期まで	湛水又は 落水
ノビエ 広葉雑草	ロイヤント乳剤 ※ホタルイ、クログワイには効果なし	ノビエ5葉期まで		落水 又はごく浅水 ※直播は 落水 散布のみ ※散布後3日以内に入水
	アレイルSC	ノビエ5葉期まで （出穂始期15日前まで）		湛水又は 落水
	トドメバスMF液剤	ノビエ6葉期まで		落水 又はごく浅水 ※直播は 落水 散布のみ
広葉雑草	バサグラン液剤	移植後15日～	播種後35日～	落水
	バサグラン粒剤		休3.0葉期～	

※収穫前使用日数など詳しくは、「営農とくらし」P58～65を参照してください。

※クリンチャーEW 無人航空機散布可能 希釈量等は営農とくらしを参照してください。

※ハイクリブームでの除草剤散布後は、しっかりと洗浄しましょう。（フィルター等も詰まりやすいので注意しましょう。）

3 カメムシ対策

農業研究所のすくい取り調査(5/19～21)では、斑点米カメムシ類が**21.3頭(平年3.4頭)**確認されるなど、**多発**しています。斑点米カメムシ類は、**品質の低下**だけでなく、色彩選別機によるくず米増加で**収量が低下**します。**畦畔及び雑草地の草刈りを徹底**し、斑点米カメムシの増殖を抑制しましょう。また、水田内のノビエやホタルイは、カメムシ類をほ場内に誘引する要因となります。水田内の除草に努めましょう。

大豆

播種後の排水対策

- ・播種直後に**排水溝の連結**や**排水口の掘り下げ**を確実に行いましょう。
- ・降雨後にはほ場を確認し、停滞水がある場合は溝の手直しをしましょう。

排水対策の効果

- ① 降雨後でも乾きやすく、出芽・苗立ちが安定 → 青立ちの防止にもつながる
- ② 根の伸びがよく、根粒が多くなり、生育が促進
- ③ 茎疫病、黒根腐病などの発生防止

農作業中の熱中症に注意！ こまめに休憩、水分補給をしましょう。