

# アスパラガス 春一期どり栽培 管理情報

福光農業協同組合

富山県砺波農林振興センター

## 1 病害虫対策

- ・「茎枯病」の予防防除の重要な時期なので、必ず防除を実施する。既に茎枯病が発生している場合は、罹病茎を抜き取り、ほ場外に持ち出して処分した後、防除する。

| 月 | 旬 | 対象<br>病害虫        | 薬剤名         | 希釈倍率    | 10a 当たり<br>散布量 | 使用時期   | 使用<br>回数 | 備考  |
|---|---|------------------|-------------|---------|----------------|--------|----------|-----|
| 7 | 上 | 茎枯病・斑点病・褐斑病      | ダコニール 1000  | 1,000 倍 | 200L           | 収穫前日まで | 4 回以内    | 混用可 |
|   |   | アザミウマ類・タバココナジラミ類 | アベンジャーフロアブル | 2,000 倍 |                | 収穫前日まで | 2 回以内    |     |
|   | 中 | 茎枯病<br>斑点病       | ロブラール水和剤    | 2,000 倍 | 200L           | 収穫前日まで | 5 回以内    |     |
|   | 下 | 茎枯病              | ベンレート水和剤    | 2,000 倍 | 200L           | 収穫前日まで | 4 回以内    | 混用可 |
|   |   | アザミウマ類<br>ハモンヨトウ | ディアナ S C    | 2,500 倍 |                | 収穫前日まで | 2 回以内    |     |
| 8 | 上 | 茎枯病・斑点病・褐斑病      | ダコニール 1000  | 1,000 倍 | 300L           | 収穫前日まで | 4 回以内    | 混用可 |
|   |   | アザミウマ類・タバココナジラミ類 | アベンジャーフロアブル | 2,000 倍 |                | 収穫前日まで | 2 回以内    |     |

※展着剤のスカッシュ又はクミテン、マイリノーを添加する。

## 2 かん水

- ・若茎伸長、養成茎(立茎)維持には水分供給が重要となる。目安として、かん水量＋降雨量として 10a 当たり 30mm(30L/㎡)/7 日間程度は必要とされる。マルチをしているが、積極的にうね間かん水を行う。

## 3 茎葉の倒伏防止

- ・フラワーネットやマイカー線を設置し、倒伏を防ぐ。

裏面あり

#### 4 追肥

- ・葉色が薄くなった場合は、病虫害防除時に※液肥(1,000倍)を混用して散布する。  
※やさい燐加安 S540(1,000倍)を混用してもよい。

#### 5 雑草対策

- ・雑草が発生した場合は、以下の除草剤をアスパラガスにかからないように注意し、うね間に散布する。

| 薬剤名             | 適用<br>雑草名 | 10a<br>当たり<br>薬量 | 10a<br>当たり<br>散布量 | 使用時期               | 使用回数 |
|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|------|
| プリグロックスL<br>(※) | 一年生雑草     | 600～<br>1,000mL  | 100～<br>150L      | 雑草生育期<br>但し、収穫前日まで | 3回以内 |

※毒物で吸入や皮膚に接触すると、生命に危険な剤なので説明書を必ず一読してから散布すること。

#### 6 農作業中の熱中症予防

- ①暑さを避ける ②こまめな休憩と水分補給 ③単独作業は避ける ④熱中症対策アイテムの活用

(問い合わせ先)

福光農業協同組合 営農部 営農指導課(高田) (電話番号 0763-52-4153)

富山県砺波農林振興センター 園芸振興班(石川) (電話番号 0763-32-8112)