

にんじんの管理情報

1 雑草対策

(1) 広葉雑草

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
ロロックス	150g (水 150L)	全面散布	にんじん 3 葉期以降 但し、収穫 30 日前まで

【注意点】

- ① にんじん本葉 3 葉期より早く散布すると薬害が発生する可能性があるため、必ず葉数を確認してから散布する。
- ② 展着剤のサーファクタントWK (150mL/水 150L) を加用する。
- ③ 除草剤を散布する前に、害虫が発生しているか確認する。発生している場合は殺虫剤を除草剤散布前に散布する(2 害虫対策参照)。

(2) イネ科雑草

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
ポルトフロアブル	300mL (水 100L)	全面散布	雑草生育期 (イネ科雑草 3 ~ 8 葉期)、但し <u>収穫 45 日前まで</u>

※スズメノカタビラを除く一年生イネ科雑草が発生した場合

(3) うね間のキク科雑草等

ロロックスの効果が劣るキク科等の雑草の発生がみられる場合は、下記の薬剤を散布する。

薬剤名	10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
バスタ液剤	300~500mL (水 100~150L)	<u>雑草茎葉散布</u> <u>(うね間処理)</u>	雑草生育期、収穫前日まで

2 害虫対策

雑草の繁茂により、害虫による食害の発見が遅れ、低収の要因となるので、ほ場の見回りを行う。害虫の発生がみられる場合は、速やかに下記の薬剤を散布する。

対象害虫	薬剤名	希釈倍率 10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
ハスモン ヨトウ	アクセルフロアブル	1,000 倍 (水 100L)	散布	収穫前日まで

裏面あり



3 病害対策

黒葉枯病を予防するため、は種 40 日後頃に下記の薬剤を散布する。

薬剤名	希釈倍率 10a 当たり使用量	使用方法	使用時期
ダコニール 1000	1,000 倍 (水 100L)	散布	収穫 7 日前まで

4 排水対策

停滞水があると、短根、岐根、腐敗等の原因となるため、うね間と額縁排水溝、横溝、排水口を連結し、雨水が速やかに排出されるよう手直しを行う。



- 横溝を切る
- 枕地を切る
- 額縁排水溝を切る

5 農作業中の熱中症予防

こまめな休憩や水分補給等を行い、熱中症を予防しましょう。

(問い合わせ先)

福光農業協同組合 営農部 営農指導課 (富田・湯浅) (電話番号 0763-52-4153)

富山県砺波農林振興センター 園芸振興班 (石川) (電話番号 0763-32-8112)