

アスパラガス管理情報(9月)

福光農業協同組合
富山県砺波農林振興センター

1 病害虫対策

茎枯病と斑点病の重要な防除時期です。既に茎枯病が発生している場合は、防除前に、発生している茎を抜き取り、ほ場外に持ち出して処分してください。

【毎月1のつく日は茎枯病予防散布 Day (1日、11日、21日)】

月	旬	対象病害虫	薬剤名	希釈倍率	10a 当たり散布量	使用時期	使用回数	備考
9	上	茎枯病、斑点病 褐斑病	ロブール水和剤	2,000 倍	300L	収穫前日まで	5回以内	
		アザミウマ類 ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4,000 倍	300L	収穫前日まで	2回以内	
	中	茎枯病、斑点病	【立茎夏秋どり栽培 ・春一期どり栽培】 Zボルドー	500 倍	300L	—	—	
		茎枯病、斑点病 褐斑病	【露地春どり栽培】 ジマンダイセン 水和剤	500 倍	300L	収穫終了後 但し秋期まで	6回以内	
	下	茎枯病、斑点病 褐斑病	ファンタジスタ 顆粒水和剤	3,000 倍	300L	収穫前日まで	3回以内	
	10	上	茎枯病、斑点病	【立茎夏秋どり栽培 ・春一期どり栽培】 Zボルドー	500 倍	300L	—	—
茎枯病、斑点病 褐斑病			【露地春どり栽培】 ジマンダイセン 水和剤	500 倍	300L	収穫終了後 但し秋期まで	6回以内	

2 ハスモンヨトウ対策

例年9月以降にハスモンヨトウ(右写真参照)の発生が見られますので、発生を確認次第、随時防除として以下の薬剤を散布してください。



裏面あり

薬剤名	希釈倍率	10a 当たり散布量	使用時期	使用回数
フェニックス顆粒水和剤	2,000 倍	300L	収穫前日まで	2回以内

※1：展着剤スカッシュ又はクミテン、マイリノーを添加する。

※2：大雨・強風の直前は、Zボルドー(500倍、使用制限なし)を散布する。

3 台風対策

○露地栽培

- ・支柱の固定、マイカー線の緩みをなくす(写真①)。
- ・うね間に水が溜まらないよう、額縁排水溝を排水口へつなぐ。



写真①

- ①サイドのマイカー線がピンと張っているかを確認する。
- ②縦方向にも麻ひもやマイカー線を約60cm間隔で設置する。


○ハウス栽培

【台風接近前の対策】

周辺部分の片付け
ハウス周りに強風で、飛ばされるものがないか、点検する
周辺をきれいに、片付けておく

- ・妻部や風あたりの強い部位は、防風ネット等を張る
- ・側面部分はビニールがめくれぬよう、スプリング、パッカー等で固定する

点検・修理の徹底
金具のゆるみ、ビニールの破れ、過去に損傷した場所の修理を徹底する



出入口の固定
風で飛ばされないようにしっかり固定する (かんめぎ等)

ハウス周辺の排水対策
ほ場が水に浸かると基礎部分が抜けやすくなる

写真②

パイプハウスの妻部への防風ネット他による補強事例

4 農作業中の熱中症予防

こまめな休憩や水分補給等を行い、熱中症を予防しましょう。

(問い合わせ先)

福光農業協同組合 営農部 営農指導課 (高田) (電話番号 0763-52-4153)

富山県砺波農林振興センター 園芸振興班 (石川) (電話番号 0763-32-8112)